این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. بنابراین لازم است به نکاتی در ارتباط با این دارو توجه نمایید که در زیر به آن اشاره شده است :

■ این دارو سرعت و قدرت عضله قلب را زیاد می کند و با ایجاد تغییراتی در سلول عضله قلب اثر خود را اعمال می کند مدت اثر این دارو ۴-۲ روز است . جهت مصرف این دارو در منزل قرص خوراکی آن تجویز می شود.

■ نکاتی که باید در مصرف این دارو به آن توجه نمایید :

۱-این دارو را می توان با غذا و یا بدون آن مصرف کرد و همچنین می توان دارو را خرد کرد و با مایعات و غذا مخلوط نمود.

۲-این دارو قدرت انقباضی قلب را افزایش و سرعت ضربان قلب را کاهش می دهد. پس باید قبل از خوردن این دارو نبض خود را بشمارید .

۳- درصورتی که تعداد نبض شما کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه و یا بالاتر از ۱۱۰ ضربه در دقیقه بود به پزشک معالج خود اطلاع دهید.



۴- علائم مسمومیت با این دارو شامل بی اشتهائی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال و یا اختلال بینایی است در صورت داشتن این علائم به پزشک خود اطلاع دهید.

۵-همزمان با مصرف این دارو ، داروهای ضد سرفه ، سرما خوردگی ، آنتی هیستامین ، آنتی اسید و داروهای گیاهی و هر نوع داروی دیگری را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.

۶- شما باید هر روز تحت شرایط استاندارد (مثلا در یک ساعت مشخص و با لباس مناسب)خود را وزن کنید و در صورتی که در یک روز بیشتر از یک کیلو گرم افزایش وزن داشتید حتما به پزشک معالج خود اطلاع دهید.



۷-احتمال مسمومیت با این دارو زیاد است پس شما باید این دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف کنید و میزان دارو را کم و زیاد نکنید و فواصل مصرف دارو را رعایت کنید و هر روز در یک زمان معین این قرص را مصرف کنید. (دارو را ناگهان قطع نکنید).

۸- دارو را از تماس با نور محافظت کنید.

۹- در صورت بروز موارد زیر پزشک را مطلع سازید:

کاهش میزان اشتها، درد در قسمت تحتانی معده ، اسهال ، ضعف ، خواب الودگی ، سردرد ، تاری دید، ضایعات پوستی، افسردگی ، کوتاهی نفس، تنگی نفس ، اضافه وزن ، ادم و سرفه مقاوم



در صورت داشتن سوال در منزل، ۸ تا ۱۴ با شماره تلفن ۰۲۸-۳۳۷۹۰۶۲۰-۲۷ داخلی ۵۰۹۷ واحد آموزش سلامت تماس بگیرید .

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

دیگوکسین



دفتر پرستاری

واحد آموزش سلامت

بازنگری تابستان ۱۴۰۵